

Dulcogas®

1. Vad DULCOGAS® är och vad det används för
Dulcogas® är en medicinteknisk produkt som bidrar till snabb lindring av magtambesvär som orsakas av överskott av gas. DULCOGAS® består huvudsakligen av simetikon, ett gashämmande medel som bryter ner gas som samlats i mage och tarm.

DULCOGAS® används:

- För att lindra väderspänningar (gasbesvär) i mag-tarmkanalen
- För lindring och symtomatisk behandling av obehag från mage och tarm såsom gasbildning, rapningar, gaser i magen, uppkördhet, uppsvälld buk och för tidig mättnadskänsla.

2. Vad du behöver veta innan du använder DULCOGAS®

Använd inte DULCOGAS® om du är allergisk (överkänslig) mot simetikon eller någon av de andra ingredienserna i DULCOGAS®.

Denna produkt innehåller sorbitol. Personer med sällsynta ärftliga problem med fruktosintolerans bör inte använda denna medicintekniska produkt.

Denna produkt innehåller pepparmintarom. Inhalation kan leda till andnöd eller astmaanfall.

Berätta alltid för din läkare om du har långvariga eller oförklarliga magproblem.

Graviditet och amning

DULCOGAS® kan tas under graviditet och amning eftersom det passerar oförändrat genom mage och tarm och inte tas upp i kroppen. Om du är gravid eller ammar bör du ändå rådfråga din läkare innan du använder DULCOGAS®.

Användning hos barn och diabetiker

Denna produkt ska inte användas av barn under 6 års ålder. DULCOGAS® är lämpligt för diabetiker. Granulaten (kornen) innehåller inte socker. Varje dospåse innehåller 1 g nedbrytbara kolhydrater.

3. Hur du använder DULCOGAS®

Ta alltid DULCOGAS® enligt instruktionerna i denna bruksanvisning. Prata med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

- DULCOGAS® ska tas i samband med måltid eller efter måltid, och vid behov före läggdags.
- DULCOGAS® kan tas utan vatten. Lägg granulaten (kornen) på tungan. Granulaten löses upp av saliven och kan sedan sväljas ner. Om du vill kan du dricka vatten efteråt.
- DULCOGAS® är en produkt som är avsedd för kortvarig användning och bör inte tas längre än 30 dagar utan att rådfråga läkare.

Rekommenderad dos (om inte läkare föreskrivit annat):

Ålder	Engångsdos	Total dagsdos
Vuxna och ungdomar från 14 år	1 – 2 dospåsar	6 dospåsar
Barn 6 – 14 år	1 dospåse	3 dospåsar

Om du tagit mer än rekommenderat eller om du glömt bort att ta DULCOGAS®

Simetikon har enbart fysikalisk effekt i magtarmkanalen. Om du tar större mängder än vad som är rekommenderat, brukar detta vanligtvis tolereras utan större besvär. Ta inte dubbel dos av DULCOGAS® för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar och samtidigt intag av andra produkter

Inga biverkningar eller interaktioner med andra produkter är kända med DULCOGAS®.

Om du märker någon biverkan ska du informera din läkare eller apotekspersonal.

5. Hur DULCOGAS® ska förvaras

Förvara medicintekniska produkter utom räckhåll för barn.

Använd inte DULCOGAS® efter att hållbarhetstiden passerats.

6. Övrig information

DULCOGAS® finns tillgänglig i förpackningar med 18 dospåsar.

Varje dospåse innehåller 125 mg simetikon.

Övriga innehållsämnen: Sorbitol, kiseldioxid, natriumkarboxymetylcellulosa och pepparmintarom.

CE 0482

Tillverkare:

HÄLSA Pharma GmbH
Maria-Goeppert-Straße 5
D-23562 Lübeck – Tyskland

Distributör:

Sanofi AB
Box 30052
104 25 Stockholm
Tel. 08-634 5000
E-post: infoavd@sanofi.com

Datum för information: december 2017